

Pronto soccorso, i 16 casi in cui DEVI portare il bambino

In caso di febbre:

- 1) nel lattante con età inferiore a tre mesi se non è stato possibile farlo visitare dal pediatra.
- 2) nei bambini più grandi se la febbre è elevata, persistente, risponde poco alla terapia antipiretica e si associa a stato di sofferenza e condizioni generali compromesse
- 3) se in presenza di febbre il bambino presenta crisi convulsive, soprattutto se di età inferiore ad un anno.

In caso di vomito:

- 4) il bambino ha bisogno di cure urgenti se presenta vomito ripetuto e non riesce ad assumere liquidi soprattutto se di età inferiore a 1 anno
- 5) se presenta altri sintomi che possono portare alla disidratazione come la febbre e numerose scariche di diarrea
- 6) se oltre al vomito presenta: secchezza della cute e della mucosa orale, occhi cerchiati, mancanza di lacrime, ridotta emissione di urine;
- 7) se vomita e non evacua da 24 ore soprattutto se di età inferiore a 1 anno
- 8) se il vomito è francamente ematico o di colore verde scuro o simile al caffè

In caso di diarrea:

- 9) se presenta diarrea ripetuta e non riesce ad assumere liquidi (vomito) soprattutto se di età inferiore a 1 anno
- 10) se presenta diarrea da oltre 24 ore con più di 5-6 scariche al giorno e non assume liquidi oppure presenta segni di disidratazione
- 11) diarrea francamente ematica o la sola emissione di sangue tipo "gelatina"

In caso di dolore addominale (cioè mal di pancia):

- 12) se non evacua da oltre 24 ore, presenta vomito, febbre e se il dolore viene localizzato nelle regioni inferiori destra dell'addome (regione appendicolare)
- 13) se presenta dolore addominale nelle ore successive ad un trauma della regione interessata

In caso di trauma cranico:

- 14) se il bambino ha perso conoscenza al momento dell'impatto (trauma cranico commotivo), o presenta vomito, qualche ora dopo il trauma, con tendenza all'addormentamento, con pianto inconsolabile, strabismo, difficoltà alla deambulazione, cefalea

In caso di cefalea, cioè mal di testa:

- 15) se accompagnata da febbre e/o da vomito e non regredisce con la somministrazione di comuni antifebrili e/o antidolorifici

In caso di difficoltà respiratoria:

- 16) i bambini, soprattutto se di età inferiore all'anno, con difficoltà respiratoria vanno tutti portati con urgenza in Pronto Soccorso se non è nota la causa e non si dispone di prescrizioni del proprio medico (esempio asma conosciuta).